

MICROBIOLOGIE



NOM..... DATE.....

2. 1 Prévenir les risques

OBJECTIF : Indiquer et justifier des mesures de préventions.

L'accident ou maladie professionnelle a toujours plusieurs causes liées à :

- ✦ L'organisation
- ✦ Le matériel
- ✦ La personne

L'examen de situations de travail permettra d'identifier les risques et de faire des propositions pour mieux les maîtriser.



Les atteintes de l'appareil respiratoire

1. Enoncer les manifestations de chaque trouble.
2. Enumérer et justifier les préventions existantes. Qu'elles soient individuelles ou collectives:

Troubles	Manifestations	Causes
Rhinite		Inhalation des produits capillaires (laques, poudres décolorantes...) L'aménagement du salon : <ul style="list-style-type: none"> - Préparation dans des locaux non ventilés. - Stockage de produits sales à l'air libre. - Mélange de produits non prévus, surdosage. - Renouvellement d'air insuffisant.
Asthme		
Prévention	<p>La loi du 9 août 1978 oblige les salons de coiffure à être équipé d'un système d'évacuation des buées et des odeurs permettant de renouveler l'air vicié. Ne pas inhaler les poudres lors de leur préparation.</p> <p>Se conformer aux modes d'emploi, informations :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Éviter les produits irritants ou allergisants. -Utiliser des produits moins volatiles. (crèmes, pâtes, poudres compactes, sprays coiffants directionnels, mousses... -Nettoyer le matériel au fur et à mesure de son usage. -Séparer les activités et ventiler les locaux (volume d'air renouvelé 5 à 7 fois par heure) 	

1. Enoncer les manifestations de chaque trouble.
2. Enumérer et justifier les préventions existantes. Qu'elles soient individuelles ou collectives:



Troubles	Manifestations	Causes
Varices		-Station debout ou assise prolongée. -Sédentarité
Ulcère variqueux		-Chaleur, vêtements trop serrés et talons plats -Grossesse
Prévention	La pratique du sport comme la natation ou la marche permet le retour veineux. Alterner douches tièdes et froides sur les jambes pour activer la circulation sanguine Surélever les pieds du lit pour diminuer la stagnation du sang dans les jambes. Eviter les vêtements trop serrés et préférer des talons d'au moins 3 cm .	

